

Coqueluche

Incubation:

7 à 21 jours

Manifestations:

Phase 1 : Écoulement nasal et éternuements accompagnés d'une toux sèche et irritante qui s'aggrave durant la nuit; dure de 1-2 semaines.

Phase 2 : Quintes de toux violente suivies d'inspirations sifflantes (chant de coq); dure 2-6 semaines.

Phase 3 : Fréquence et gravité de la toux diminue; dure plusieurs semaines.

Transmission:

Par contact direct avec les sécrétions du nez et de la gorge des personnes infectées.

Période de contagion:

Hautement transmissible pendant la première phase. Après traitement par antibiotiques, la contagion dure 5-7 jours.

Que faire à la maison? :

Diminuer les facteurs qui peuvent stimuler la toux (poussière, fumée, changement soudain de température, excitation, etc.). Encourager les liquides et une bonne alimentation. Des antibiotiques à titre préventif sont prescrits aux personnes les plus vulnérables (les enfants de moins de 1 an et les femmes enceintes au 3^e trimestre) et aux contacts familiaux lorsque la famille compte une personne vulnérable.

Le retour à l'école:

Si des individus à haut risque sont présents, exclure l'enfant pour 5 jours après le début du traitement antibiotique ou 3 semaines après le début de la toux (si non traitée). Informer les parents dont les enfants ont été en contact avec l'enfant atteint. Vérifier l'état vaccinal de l'enfant atteint et de tout contact étroit.